

Soledum® forte

Nazwa i postać farmaceutyczna: Soledum® forte, kapsułki dojelitowe, miękkie. **Skład:** Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu (Cineolum). Substancja pomocnicza, która ma istotne znaczenie dla właściwego stosowania produktu leczniczego: sorbitol. Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 17 mg sorbitolu. **Wskazania do stosowania:** Jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu. Leczenie wspomagające ostrego, nieropnego zapalenia zatok. **Dawkowanie:** Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę. W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu 1 kapsułka 2 razy na dobę. **Sposób podawania:** Podanie doustne. **Przeciwwskazania:** Nie należy stosować Soledum® forte u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na cyneol lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w przypadku występowania krztuśca lub pseudo-krztuśca, u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Soledum® forte należy stosować ze szczególną ostrożnością w przypadku chorób związanych z nadwrażliwością dróg oddechowych. Soledum® forte nie może być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy. Jedna kapsułka leku Soledum® forte odpowiada 0,0015 jednostkom chlebowym. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli występują zaburzenia oddychania, gorączka lub pacjent odkrztusza ropną lub krwawą wydzielinę. **Działania niepożądane:** Zaburzenia układu immunologicznego. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel. Po wystąpieniu pierwszych oznak któregośkolwiek z objawów nadwrażliwości, należy niezwłocznie przerwać stosowanie Soledum® forte. Zaburzenia żołądka i jelit. Niezbyt często: np. nudności, biegunka. Rzadko: np. dysfagia (trudności w połykaniu). **Podmiot odpowiedzialny:** M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPL nr: 25445. Kategoria dostępności: OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 12.07.2019 r.